Tratol® TOLTRAZURILO

Alfredo Romero

Gerente de Marketing de la Unidad de Porcino. Pfizer Salud Animal

Por otro lado, existirá una mayor desigualdad en los lotes al destete, a la entrada al cebadero y en el momento del sacrificio en el matadero.

¿Cuáles son las pautas de prevención y manejo recomendadas para esta parasitosis?

Lo primero es un adecuado manejo y, sobre todo, garantizar la higiene, en la fase de lactación. Es necesaria una buena limpieza, seguida de una desinfección de las salas de parto, así como respetar el vacío sanitario que tiene que ser de al menos cuatro días. También es importante ser muy escrupulosos en el manejo de los lechones en los primeros días de vida para evitar la contaminación entre camadas.

Y además, prevenir esta parasitosis mediante el empleo de Tratol® (toltrazurilo 50 mg/ml), reconocido como el tratamiento más eficaz para la prevención de la coccidiosis porcina.

"El uso de Tratol® previene el desarrollo de la coccidiosis y por tanto de las lesiones que se producirían a nivel intestinal"

La coccidiosis neonatal de lechones sigue siendo un problema en las granjas, ¿Cuál es su prevalencia actual en nuestro país?

Según las últimas referencias, la prevalencia actual en nuestro país es de un 85% de las explotaciones afectadas de coccidiosis neonatal*.

¿Cómo influye esta patología en la rentabilidad de la producción?

La coccidiosis influye de manera negativa sobre el animal ya que produce un retraso en el crecimiento del lechón en su etapa de lactación, con lo cual alcanza menor peso al destete, siendo así un lastre para el resto de su vida productiva y necesitando más tiempo para alcanzar el peso de sacrificio. Al tener reducida su velocidad de crecimiento en la fase de lactación, el lechón pesará menos en su destete y, comparado con otros lechones sanos, arrastrará un déficit de crecimiento y peso a lo largo de toda la vida del animal.

La desinfección de las salas es un punto crítico ¿Qué pautas son las más eficaces en este sentido?

Previamente a la desinfección hay que realizar una limpieza con agua caliente a presión (70º C) y emplear detergentes. A continuación, utilizar desinfectantes lo más eficaces posibles frente a las formas esporuladas de *Isospora suis*.

En las diarreas neonatales suele haber otros agentes, aparte de coccidios, implicados como E. coli y otros ¿Cuál es su recomendación para un tratamiento eficaz que solucione el problema?

Para ampliar el control de las diarreas neonatales, además del uso de toltrazurilo (Tratol®) de manera preventiva, es fundamental la vacunación de las madres frente a la colibacilosis y clostridiosis neonatal. A este respecto Pfizer recomienda la vacunación con Gletvax 6® previo al parto con dos dosis para las cerdas primerizas y una dosis de recuerdo para las multíparas.

El uso de antibióticos inyectables sólo se recomienda para el tratamiento de las diarreas neonatales de origen bacteriano.

Con respecto a los virus como agentes implicados en estas diarreas, no existe ningún tratamiento eficaz, por lo que sólo podemos controlarlo garantizando una correcta higiene y mediante el control de los factores de manejo.

¿Qué aporta Tratol® al tratamiento de esta enfermedad?

El uso de Tratol® previene el desarrollo de la enfermedad, y por tanto, de las lesiones que se producirían a nivel intestinal que repercuten negativamente en la absorción de los nutrientes, y en el crecimiento y desarrollo de los lechones.

Es importante el uso preventivo porque estas lesiones con un tratamiento tardío hacen que la funcionalidad del intestino esté reducida en toda la fase de crecimiento del animal.

¿Contra qué tipos de coccidios es eficaz Tratol®?

Tratol® se recomienda para la prevención de la coccidiosis producida por *Isospora suis* en los

lechones lactantes y es eficaz frente a todas las formas intracelulares de este parásito.

¿En qué dosis se presenta y cuáles son las pautas de administración recomendadas?

Tratol® está disponible en dos presentaciones: 250 ml y un litro. La dosis recomendada es de 0,4 ml por kg de peso corporal cuando se utiliza toltrazurilo a una concentración de 50 mg/ml (Tratol®). Se aplica de manera preventiva con una sola dosis en lechones de 3 a 5 días de edad.

** Referencias a vuestra disposición contactando con Pfizer Salud Animal.*